

AVASTIN

Mis à jour le lundi 19 novembre 2012

Dr Isabelle Cojean-Zelek

Le but de cette notice d'information est de vous présenter le traitement de chimiothérapie. L'Avastin est un anticorps qui réduit la vascularisation des tumeurs, inhibant ainsi la croissance tumorale.

Les modalités d'administration

Ce traitement s'administre par des perfusions dans votre chambre implantable (CCI), tous les quinze jours ou toutes les trois semaines. Il s'effectue seul ou en complément d'un autre traitement. Sa durée est de 1h 30 la première fois, 1h la deuxième fois et de 30 minutes pour les cures suivantes.

Les effets secondaires

Hypertension artérielle (HTA)

Une élévation de la tension artérielle (TA) a été observée. C'est pourquoi, une surveillance de votre TA sera effectuée avant chaque injection. Si vous êtes déjà suivi(e) pour une HTA, il faudra surveiller votre TA une fois par semaine entre les cures.

Protéinurie

Un échantillon d'urine vous sera demandé avant chaque injection, pour effectuer un contrôle par bandelette urinaire.

Retard à la cicatrisation des plaies

L'Avastin peut retarder la cicatrisation des plaies. Pour cette raison, on observe un délai d'un mois après toute chirurgie (sauf urgences) avant le traitement.

Saignements

Des saignements de nez ou de gencives peuvent apparaître mais ils sont sans gravité.